FRONT

GABAY SA PAGTATANIM NG DRAGONFRUIT

Farm Defends

Mga uri ng dragonfruit

Red flesh variety | White flesh variety

elstarya.

3. **Pagtatanim ng sanga** - Ang mga lantan, matigla at walang sakit na sanga na may 1/2 metro hanggang mang [illegible] lalim ang itatanim kalakasan pagkatapos ng panahon ng tag-ulan.

4. **Pagbubuwa ng dame** - Sa pag-aaral ni MS Silan, mahalaga ang dame na pagkakondisyon ng temperatura ng lupang tratamuan ng dragon

Hunyo hanggang December namun ay [illegible]

Hunyo AM (Kapre): Dinidilgan dun ang mga tanim ng organic fulter na Organic Mikagim [illegible]

- **Hyperpunitili ng kalusugan ng mga dragon fruit** - Kailangang tanggalin ang mga sanga na may sakit at dilgan ang bawat puno ng dragon fruit ng higit sa apat na gulon ng tubig kada araw. Ang mga atmenam namun ay inilalagay para sa fruit flies na umaatake na mga dragon fruit. Ang mga sanga na may sakit ay dapat sunugin upang hindi makahawa.

Pag-ani

Kasanayan na ni MS Silan na balutan ng plastic ang mga bunga ng dragon fruit makalipas ang 45 araw ng pamumulak